

## Comment la préserver ?

### Exemple... sur le site de nature d'Amaury

La colonie de sternes s'est installée sur le site en 2004 et a commencé à utiliser les toits de hutte pour se reproduire. Depuis, l'effectif d'oiseaux nicheurs augmente lentement mais régulièrement pour atteindre 10 couples en 2015. Le succès de la reproduction est cependant aléatoire en raison notamment des dérangements pouvant être occasionnés par les différents usagers. Afin de favoriser la conservation de l'espèce sur le site, un partenariat a été noué avec l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions partagées et acceptées de tous. Ainsi, l'association Paysage-Environnement a proposé et réalisé avec l'aide du Parc naturel régional l'aménagement

de deux anciens pontons favorables à la nidification des sternes. En parallèle, certains toits de hutte seront succinctement aménagés pour éviter la noyade des poussins lors de chutes provoquées par la fréquentation des huttes par les usagers légaux.



PONTON AMÉNAGÉ POUR LA NIDIFICATION

### ...sur le site de Chabaud-Latour

Les sternes se sont installées également en 2004 sur les toits de huttes situées sur des parcelles propriétés de la Fondation pour la protection des Habitats et de la Faune sauvage. Soucieuse de participer à la préservation de cette espèce emblématique des interactions entre l'Homme et la Nature, la Fédération des chasseurs du Nord a également programmé l'aménagement d'un certain nombre de toits de huttes (barrière d'enceinte évitant la chute des poussins et positionnement d'abris).

## Envoyez vos données

Vos observations nous intéressent. Vous pouvez nous les communiquer soit en les saisissant directement dans la base de données faunistiques régionale ([www.sirf.eu](http://www.sirf.eu)) soit par courrier ou par mail au :

**Parc naturel régional Scarpe-Escout**  
**357 rue Notre-Dame d'Amour**  
**BP 8055**  
**59 731 Saint-Amand-les-Eaux**  
**contact@pnr-scarpe-escout.fr**



Parc naturel régional Scarpe-Escout - UNE AUTRE VIE S'INVENTE ICI

# la Sterne pierregarin

Une espèce à découvrir...



© PNR Scarpe-Escout - avril 2016 - Photos : Fbarz, Mircea Bezerigheanu, David Delecourt, Thierry Tancrez, Samuel Dhote, Mario Lecci, GON Le Vanneau - Mise en page : Stéphane Descamps - Impression : Ouallit' Imprim



AGENCE DE L'EAU  
NORD-PAS-DE-CALAIS



# Un oiseau au bec rouge

Les sternes, parfois appelées hirondelles de mer, sont des oiseaux aux longues ailes et au vol gracieux. Leur tête est couverte d'une calotte noire tandis que le reste de leur plumage est blanc ou cendré.

La Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) a un bec rouge qui se termine par une pointe noire. Les pattes sont également rouge orangé chez les adultes et plus rosées chez les jeunes. D'une taille moyenne de 39 centimètres, elle pèse entre 90 et 150 grammes. Déployant ses longues ailes, son envergure peut atteindre 83 centimètres. Cet oiseau migrateur peut vivre une bonne vingtaine d'années.


La Sterne pierregarin est une espèce protégée (articles 1 et 5 de l'arrêté du 17 avril 1981) et inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux permettant la désignation de Zones de protection spéciale destinées à la préservation de ses habitats.



## Où la trouver ? de mars à septembre en France

En France, la Sterne pierregarin niche essentiellement entre la Normandie et l'estuaire de la Gironde, le long des grands fleuves et affluents (Loire, Seine, Allier, Rhin) et sur le littoral méditerranéen. Elle recherche préférentiellement des îlots, des bancs de sables et de galets. A défaut d'habitats naturels, elle s'installe parfois sur des pontons, des embarcadères, des toits de huttes de chasse ou encore sur des radeaux de nidification installés à son égard. L'essentiel pour elle étant de se sentir à l'abri de ses prédateurs terrestres.

Après avoir passé l'hiver sur le littoral occidental africain entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, elle rejoint ses sites de nidification au cours du mois de mars. En Scarpe-Escaut, c'est au cours du mois d'avril que les couples s'installent sur leurs lieux habituels de nidification : le site de nature d'Amaury à Hergnies-Vieux-Condé et l'étang de Chabaud-Latour à Condé-sur-l'Escaut, exclusivement sur des toits de hutte de chasse. En région, il s'agit des deux seules sites occupés par l'espèce à l'intérieur des terres.



En bleu, les départements où l'espèce est présente.

## Fidèle au site de reproduction

Chez cette espèce assez grégaire, les couples s'installent souvent très près les uns des autres et restent fidèles chaque année à leur site de nidification.

Dans le nid, simple excavation ou dépression dans le sol, la femelle pond 2 ou 3 œufs de couleur crème tachetés de brun-gris. Sur les toits de huttes, les filets de camouflage disposés par les chasseurs permettent d'éviter que les œufs ne roulent. Ils les dissimulent également de certains prédateurs (corneilles ou goélands).

La couvaison commence dès la ponte du dernier œuf et dure généralement une vingtaine de jours ; elle est assurée par les deux adultes. Le succès de la reproduction est très variable et dépend essentiellement du dérangement des colonies. Jusqu'à l'envol des oisillons, ces derniers sont nourris par les deux parents. On profite alors de leurs ballets incessants au-dessus de l'eau avant de plonger en piqué vers la surface pour capturer les poissons et venir nourrir leurs petits. La présence de cette espèce exclusivement piscivore témoigne de la bonne qualité écologique des pièces d'eau où elle s'installe.



FILET DE CAMOUFLAGE SUR TOIT DE HUTTE



POUSSIN RISQUANT DE TOMBER DU TOIT

