

ESSENCES RECOMMANDÉES

| Herbacées fleuries | Nom latin | Vivace / annuelle | Floraison | Date de floraison | Conditions |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|---|
| Achillée millefeuille | <i>Achillea millefolium</i> | Vivace | Blanche | De juin à septembre | Peut supporter des sols secs |
| Aigremoine eupatoire | <i>Agrimonia eupatoria</i> | Vivace | Jaune | De juin à août | |
| Ail des vignes | <i>Allium vineale</i> | Vivace | Blanchâtre - rosâtre | De juin à août | Bien adaptée aux terrains secs |
| Bleuet des champs | <i>Centaurea cyanus</i> | annuelle | Bleue | De mai à août | |
| Bouillon blanc | <i>Verbascum thapsus</i> | Bisannuelle | Jaune | De juin à septembre | Peut s'installer sur les terrains les plus secs |
| Bourrache | <i>Borago officinalis</i> | Annuelle | Bleue | De juin à octobre | |
| Brunelle commune | <i>Prunella vulgaris</i> | Vivace | Bleue violet | Juin à septembre | |
| Campanule gantelée | <i>Campanula trachelium</i> | Vivace | Bleue | Juillet-août | Supporte volontiers un peu d'ombre |
| Canche cespiteuse | <i>Deschampsia cespitosa</i> | Graminée | Epis gris/pourpres | De juillet à septembre | Mi-ombre |
| Cardamine des prés | <i>Cardamine pratensis</i> | Vivace | Violacée pâle à blanche | D'avril à juin | Exige une certaine humidité |
| Carotte sauvage | <i>Daucus carota</i> | Bisannuelle | Blanche | De juin à octobre | |
| Centaurée scabieuse | <i>Centaurea scabiosa</i> | Vivace | Pourpre | De juillet à août | |
| Chicorée sauvage | <i>Cichorium intybus</i> | Vivace | Bleue | Juillet à septembre | |
| Chrysanthème des moissons | <i>Glebionis segetum</i> | Annuelle | Jaune | De juin à octobre | |
| Compagnon blanc | <i>Silene latifolia alba sbsp. alba</i> | Vivace | Blanche (s'ouvrent la nuit) | De juin à août | |
| Compagnon rouge | <i>Silene dioica</i> | Vivace | Rose vif | D'avril à juin | Ne craint pas l'ombrage |
| Coquelicot | <i>Papaver rhoeas</i> | Annuelle | Rouge | De juin à septembre | |
| Digitale pourpre | <i>Digitalis purpurea</i> | Bisannuelle | Pourpre rosée | De juin à août | Aime l'ombrage. Toxique |
| Epilobe en épi | <i>Epilobium augustifolium</i> | Vivace | Rose violacée | Juillet-août | Un peu d'ombre ne la gêne pas |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|------------------|------------------------|--|
| Eupatoire chanvrine | <i>Eupatorium cannabinum</i> | Vivace | Rose blanchâtre | De juillet à octobre | Attraction pour l'humidité mais ne craint pas les terrains plus secs |
| Euphorbe des bois | <i>Euphorbia amygdaloides</i> | Vivace | Jaune | D'avril à juillet | Endroits ombragés |
| Flouve odorante | <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Vivace | Verdâtre - jaune | De mars à juillet | |
| Géranium à feuilles molles | <i>Geranium molle</i> | Annuelle | Pourpre clair | D'avril à septembre | |
| Géranium des prés | <i>Geranium pratense</i> | Vivace | Bleue violet | De juin à septembre | |
| Géranium des pyrénées | <i>Geranium pyrenaicum</i> | Vivace | Violet | De mai à octobre | |
| Grande berce | <i>Heracleum sphondylium</i> | Bisannuelle | Blanc | De juillet à septembre | |
| Knautie des champs | <i>Knautia arvensis</i> | Vivace | Bleue - violet | De mai à septembre | |
| Lamier jaune | <i>Lamium galeobdolon</i> | Vivace | Jaune | De mai à juillet | Endroits ombragés |
| Lotier corniculé | <i>Lotus corniculatus</i> | Vivace | Jaune | De mai à septembre | |
| Lychnis fleur de coucou | <i>Lychnis flos-cuculi</i> | Vivace | Rose | De mai à juillet | A besoin d'un minimum d'humidité |
| Lysimachie commune | <i>Lysimachia vulgaris</i> | Vivace | Jaune | Juillet -août | Nécessite un terrain assez humide |
| Marguerite | <i>Leucanthemum vulgare</i> | Vivace | Jaune et blanche | De mai à août | Peut se contenter de terrains assez secs |
| Mauve musquée | <i>Malva moschata</i> | Vivace | Rose | De juillet à septembre | |
| Mauve sylvestre | <i>Malva sylvestris</i> | Vivace | Rose pourpre | De juin à septembre | |
| Mélilot jaune | <i>Melilotus officinalis</i> | Bisannuelle | Jaune | De juin à octobre | Ne craint pas les sols plutôt secs |
| Millepertuis commun | <i>Hypericum perforatum</i> | Vivace | Jaune | De juillet à septembre | Adapté aux terrains secs |
| Nielle des blés | <i>Agrostemma githago</i> | Annuelle | Violacée | De mai à août | Toxique |
| Onagre à sépales rouges (horticole, non indigène) | <i>Oenothera glazioviana</i> | Bisannuelle | Jaune | De juin à septembre | Ne craint pas la sécheresse |
| Origan | <i>Origanum vulgare</i> | Vivace | Pourpre foncé | De juillet à septembre | Affectionne les terrains secs, surtout calcaires |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--|
| Pâquerette | <i>Bellis perennis</i> | Vivace | Jaune et blanche | D'avril à octobre | Peu exigeante sur la qualité du sol |
| Pâturin des prés | <i>Poa pratensis</i> | Vivace | | | |
| Petite pimprenelle | <i>Sanguisorba minor</i> | Vivace | Rouge - verte | Juin - juillet | |
| Phacélie | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | Annuelle | Bleue | De juillet à septembre | |
| Primevère élevée | <i>Primula elatior</i> | Vivace | Jaune | Mai juin | Mi-ombre |
| Pulicaire dysentérique | <i>Pulicaria dysenterica</i> | Vivace | Jaune | De juillet à septembre | Préfère les terrains humides |
| Reine des prés | <i>Filipendula ulmaria</i> | Vivace | Blanche | De juin à septembre | Affectionne l'humidité mais sans trop l'exiger |
| Salsifis des prés | <i>Tragopogon pratensis</i> | Bisannuelle | Jaune | Juin - juillet | |
| Saponaire | <i>Saponaria officinalis</i> | Vivace | Rose | De juin à septembre | |
| Sauge des prés | <i>Salvia pratensis</i> | Vivace | Bleue foncé - violet | De juin à août | |
| Séneçon jacobée | <i>Senecio jacobaea</i> | Vivace | Jaune | De juillet à octobre | Peut se contenter de sols plutôt secs |
| Tanaisie | <i>Tanacetum vulgare</i> | Vivace | Jaune | De juillet à octobre | |
| Trèfle incarnat | <i>Trifolium incarnatum</i> | Annuelle | Rouge | De mai à juin | Peut se contenter de terrains peu fertiles |
| Trèfle des prés | <i>Trifolium pratense</i> | Vivace | Rose | De mai à août | Pas trop difficile sur la qualité du sol |
| Trèfle blanc | <i>Trifolium repens</i> | Vivace | Blanche | D'avril à septembre | |
| Vipérine | <i>Echium vulgare</i> | Bisannuelle | Bleue | De juin à septembre | Affectionne les terrains secs, surtout calcaires |

| Essences couvre-sol | Nom latin | Vivace / annuelle | Floraison | Date de floraison |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Lierre terrestre | <i>Glechoma hederacea</i> | Vivace | Rose, bleu-violet | Mars à octobre |
| Lierre | <i>Hedera helix</i> | Vivace | Jaune verdâtre | Septembre - octobre |
| Petite pervenche | <i>Vinca minor</i> | Vivace | Bleue | D'avril à juin |
| Bugle rampante | <i>Ajuga reptans</i> | Vivace | Bleue foncée | Mai-juin |
| Ficaire | <i>Ranunculus ficaria</i> | Vivace | Jaune | Mars - mai |
| Lotier corniculé | <i>Lotus corniculatus</i> | Vivace | Jaune | De mai à septembre |
| Petite pimprenelle | <i>Sanguisorba minor</i> | Vivace | Rouge - verte | Juin - juillet |
| Aspérule odorante | <i>Galium odoratum</i> | Pluriannuelle | Blanche | De mai à juin |
| Lamier jaune | <i>Lamium galeobdolon</i> | Vivace | Jaune | De mai à juillet |
| Alchémille (horticole, non indigène) | <i>Alchemilla mollis</i> | Vivace | Vert clair | De mai à octobre |
| Nepeta (horticole, non indigène) | <i>Nepeta sibirica et autres</i> <i>Nepeta sp.</i> | Vivace | Bleue | De mai à octobre |

| Essences de pelouse urbaine rustique | Nom latin | Vivace / annuelle | Floraison | Date de floraison |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Brunelle commune | <i>Prunella vulgaris</i> | Vivace | Bleue violet | Juin à septembre |
| Fétuque rouge | <i>Festuca rubra</i> | | | |
| Luzule champêtre | <i>Luzula campestre</i> | | | |
| Pâquerette | <i>Bellis perennis</i> | Vivace | Jaune et blanche | D'avril à octobre |
| Potentille ansérine | <i>Potentilla anserina</i> | Vivace | Jaune | De juin à août |
| Potentille rampante | <i>Potentilla reptans</i> | Vivace | Jaune | De juin à août |
| Ray-grass commun | <i>Lolium perenne</i> | Vivace | Verdâtre | De mai à juin |
| Trèfle blanc ou rampant | <i>Trifolium repens</i> | Vivace | Blanche | D'avril à septembre |

Essences aquatiques et de milieux humides

Nom latin

Plantes strictement aquatiques

Callitriche à angle obtus

Callitriche obtusagulosa Le Gall

Callitriche à fruit plat

Callitriche platycarpa Kürtz

Cornifle nageant

Ceratophyllum demersum L.

Myriophylle en épis

Myriophyllum spitacum

Nénuphar jaune

Nuphar lutea (L.) Smith

Potamot pectiné

Potamogeton pectinatus

Plantes pour les berges

Ache nodiflore

Apium nodiflorum (L.) Lag.

Alpiste roseau (Baldingère)

Phalaris arundinacea L.

Consoude officinale

Symphytum officinale L.

Cresson officinal

Nasturtium officinale R. Brown

Eupatoire chanvrine

Eupatorium cannabinum L.

Filipendule ulmaire

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Gaillet des marais

Gallium pallustre L.

Glycerie aquatique

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg

Iris faux acore (Iris jaune, iris des fontaines)

Iris pseudoacorus L.

Jonc épars

Juncus effusus L.

Jonc glauque

Juncus inflexus L.

Laiche des marais

Carex acutiformis Ehrh.

Laiche des rives

Carex riparia Curt.

Massette à larges feuilles

Typha latifolia L.

| | |
|---|---|
| Myosotis des marais | <i>Myosotis scorpioides L.</i> |
| Phragmite commun (roseau commun, phragmite) | <i>Phragmites australis (Cav.) Steud.</i> |
| Plantain d'eau commun | <i>Alisma plantago aquatica L.</i> |
| Renouée amphibie | <i>Persicaria amphibia (L.) Besser</i> |
| Rhorippe amphibie | <i>Rorripa amphibia (L.) Besser</i> |
| Rubanier rameux (s.l) | <i>Sparganium erectum L.</i> |
| Salicaire commune | <i>Lythrum salicaria</i> |
| Valériane rampante (Herbe aux chats) | <i>Valeriana repens Host</i> |
| Véronique mouron d'eau | <i>Veronica anagallis-aquatica L.</i> |
| | |
| | |
| Plantes pour prairies humides fleuries | |
| Agrostide stolonifère | <i>Agrostis stolonifera L.</i> |
| Cardamine des prés | <i>Cardamine palustris L.</i> |
| Centaurée jacée | <i>Centaurea jacea L.</i> |
| Epiaire des marais | <i>Stachys palustris</i> |
| Epilobe à petites fleurs | <i>Epilobium parviflorum Schreb.</i> |
| Gesse des prés | <i>Lathyrus pratensis L.</i> |
| Lotier des fanges | <i>Lotus pedunculatus Cav.</i> |
| Lychnide fleur de coucou | <i>Lychnis flos-cuculi L.</i> |
| Lysimachie nummulaire (Herbe aux écus) | <i>Lysimachia nummularia L.</i> |
| Luzerne lupuline | <i>Medicago lupulina L.</i> |
| Menthe aquatique | <i>Mentha aquatica L.</i> |
| Millepertuis perforé | <i>Hypericum perforatum</i> |
| Populage des marais | <i>Caltha palustris L.</i> |

Pulicaire dysentérique

Renoncule flammette

Renoncule rampante

Trèfle des prés

Trèfle rampant

Vesce à épis

Pulicaria dysenterica

Ranunculus flammula L.

Ranunculus repens L.

Trifolium pratense

Trifolium repens L.

Vicia cracca L.

| Essences arbustives | Nom latin | Essence à fruit | Essence mellifère | Feuillage persistant |
|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Bourdaine | <i>Frangula alnus</i> | | X | |
| Buis | <i>Buxus sempervirens</i> | | | X |
| Cornouiller sanguin | <i>Cornus sanguinea</i> | X | | |
| Eglantier | <i>Rosa canina</i> | X | | |
| Fusain d'Europe | <i>Euonymus europaeus</i> | X | | |
| Houx | <i>Ilex aquifolium</i> | X | | X |
| Genêt à balai | <i>Cytisus scoparius</i> | | | X |
| Nerprun purgatif | <i>Rhamnus cathartica</i> | | | |
| Noisetier | <i>Corylus avellana</i> | X | X | |
| Orme champêtre | <i>Ulmus minor</i> | | | |
| Prunellier | <i>Prunus spinosa</i> | X | X | |
| Saule marsault | <i>Salix caprea</i> | | X | |
| Saule osier | <i>Salix viminalis</i> | | | |
| Sureau | <i>Sambucus nigra</i> | X | X | |
| Troène d'Europe | <i>Ligustrum vulgare</i> | X | X | |
| Viorne mancienne | <i>Viburnum lantana</i> | X | | |
| Viorne obier | <i>Viburnum opulus</i> | X | | |

Plantes grimpantes

Nom latin

Essence à fruit

Essence mellifère

| | | | |
|------------------------|------------------------------|---|---|
| Chèvrefeuille des bois | <i>Lonicera periclymenum</i> | X | |
| Clématite des haies | <i>Clematis vitalba</i> | X | |
| Houblon | <i>Humulus lupulus</i> | | |
| Lierre | <i>Hedera helix</i> | | X |

Essences arborescentes

Nom latin

Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Charme
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Erable champêtre
Erable sycomore
Hêtre
Merisier
Noyer commun
Peuplier tremble
Saule blanc
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles

Alnus glutinosa
Betula verrucosa
Carpinus betulus
Quercus robur
Quercus petraea
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica
Prunus avium
Juglans regia
Populus tremula
Salix alba
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Essences fruitières – pommiers
(d'après la liste Plantons le Décor)

Période de floraison

Période de récolte

| | Période de floraison | Période de récolte |
|---|--------------------------|---|
| Belle fleur simple (Petit bon ente) | Très tardive | Octobre |
| Cabarette | Moyenne saison | Fin octobre |
| Colapuis (Nicolas Puy) | Précoce à moyenne saison | Fin octobre – début novembre |
| Court pendu rouge (Court pendu Rosa) | Très tardive | Fin septembre |
| Double bon, Pommier rouge | Tardive | Fin septembre |
| Gris Brabant (Gris Braibant) | Précoce | Début octobre |
| Gueule de mouton | Moyenne saison | Mi-octobre |
| Jacques Lebel | Précoce | Fin août à fin septembre |
| Lanscailler | Moyenne saison | 1 ^{ère} quinzaine d'octobre |
| Reinette de France | Très tardive | 1 ^{ère} quinzaine d'octobre |
| Reinette de Fugélan | Précoce | Fin septembre |
| Reinette de Hollande | Précoce | 1 ^{ère} quinzaine d'octobre |
| Reinette de Waleffe | Moyenne saison | Fin septembre - début octobre |
| Reinette des Capucins | Précoce | Début octobre |
| Reinette Descardre | Moyenne saison | Fin septembre |
| Reinette étoilée | Très tardive | 2 ^{ème} quinzaine de septembre |
| Reinette Hernaut | Moyenne saison | Début octobre |
| Sang de boeuf | Moyenne saison | 1 ^{ère} quinzaine d'octobre |
| Sans Pareille de Peasgood | Moyenne saison | Mi-septembre |
| Tardive de Bouvignies (Rambour d'hiver) | Tardive | 2 ^{ème} quinzaine de septembre |

Essences fruitières – poiriers
(d'après la liste Plantons le Décor)

| | Période de floraison | Période de récolte |
|---|--------------------------|---|
| Beurré d'Anjou (Nec plus ultra Meuris) | Très précoce à précoce | Fin septembre |
| Beurré Lebrun (Lebrun) | Moyenne saison | Fin août-début septembre |
| Beurré Superfin | Moyenne saison | Mi-septembre |
| Comtesse de Paris | Très précoce à précoce | Mi-octobre |
| Cornélie (Désiré Cornélis) | Moyenne saison | Fin août |
| Madame Grégoire | Précoce | Début octobre |
| Poire à Clément | Moyenne saison à tardive | Mi-août |
| Sans pépins (Marquise d'Hem, Belle de Bruxelles) | Tardive à très tardive | Fin août à septembre |
| Sucrée de Montluçon | Très précoce à précoce | Début octobre |
| Triomphe de Vienne | Moyenne saison à tardive | Fin août |
| Poire à Côte d'or (Saint-Mathieu d'hiver, Belle de Moncheaux) | Très tardive | 1 ^{ère} quinzaine d'octobre |
| Poire de Livre | Tardive | 1 ^{ère} quinzaine d'octobre |
| Poire Reinette (Poire Rognette) | Moyenne saison | 2 ^{ème} quinzaine d'août |
| Saint-Mathieu | Tardive | 2 ^{ème} quinzaine de septembre |

Essences fruitières – pruniers
(d'après la liste Plantons le Décor)

| | Période de floraison | Période de cueillette/ consommation |
|---|--------------------------|---|
| Coe violette (Goutte d'or violette) | Moyenne saison | Début septembre |
| Goutte d'or de Coe (Coe's Golden Drop) | Moyenne saison | Mi-septembre |
| Monsieur Hâtif (Prune de Roi) | Très précoce à précoce | Début août |
| Reine Claude d'Althan (Conducta) | Moyenne saison | Fin août |
| Reine Claude dorée (Reine Claude verte) | Moyenne saison | Mi-août |
| Reine Claude rouge hâtive | Tardive | 2 ^{ème} quinzaine de juillet, début août |
| Sainte Catherine | Moyenne saison à tardive | Fin septembre |

Essences fruitières – cerisiers
(d'après la liste Plantons le Décor)

Période de floraison

Période de cueillette/
consommation

| | Période de floraison | Période de cueillette/ consommation |
|---------------------------|------------------------|--|
| Cerise Blanc-Nez | Tardive | Mi-juin |
| Cerise Blanche d'Harcigny | Tardive | Fin juin – début juillet |
| Cerise de Moncheaux | Tardive à très tardive | Mi-juillet |
| Cerise du Sars | Précoce | 2 ^{ème} quinzaine de juin |
| Griotte de Vieux Condé | Moyenne saison | Mi-juillet |
| Guigne noire du Pévèle | Précoce | Fin juin - début juillet |

Essences fruitières – pêchers
(d'après la liste Plantons le Décor)

Période de floraison

Période de récolte

Pêche de Moncheaux

Moyenne saison

Mi-août

La plantation de ces essences rustiques et adaptées aux conditions du milieu s'accompagnera de mesures de gestion écologiques sans utilisation de produits chimiques (phytosanitaires, engrais) : pratique du faux semis, mulchage, paillage (compost de feuilles, produits de tontes par ex), moins de tontes et tontes plus hautes, désherbage mécanique, manuel ou thermique, rationalisation de l'arrosage...